

当院が推奨するワクチンスケジュール(1歳半まで)

		生後2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7~8か月	12か月	13か月	15~18ヶ月頃	
B型肝炎ワクチン	定期	①	②				③				③は②の4~5か月後。
ロタウイルスワクチン	任意	①	②	(③)	ロタリックス2回接種、ロタテック3回接種					生後14週6日までに接種を開始する。使用ワクチンによって接種回数異なる。	
ヒブワクチン	定期	①	②	③					④		④は1歳以降③から7か月以上あけてできるだけ早期に。
肺炎球菌ワクチン	定期	①	②	③					④		④は1歳以降③から2か月以上あけてできるだけ早期に。
四種混合ワクチン	定期		①	②	③				④		④は③の6か月後から接種可能。
BCG	定期				○						1歳未満。生後5~8か月頃を推奨。
MRワクチン	定期							①			②は就学前の1年間に。
水痘ワクチン	定期							①		②	②は①接種後3か月~6か月を推奨。
おたふくかぜワクチン	任意							①			②は4歳頃~就学前までに。

※ MRワクチン、水痘ワクチン、おたふくかぜワクチンは1歳を過ぎたら出来るだけ速やかに接種する。

当院が推奨するワクチンスケジュール(1歳半以降)

		3歳	3歳1か月	4歳	5~6歳	9歳	10歳	11歳	12歳	
日本脳炎ワクチン	定期	①	②	③			④			③は概ね②の6か月~1年後。流行地域などでは3歳前でも接種を推奨。
MRワクチン	定期				②					②は小学校入学前1年間に。
おたふくかぜワクチン	任意			②						②は4~6歳頃。小学校入学までに2回の接種を終わらせるのが望ましい。
不活化ポリオワクチン	任意				○					
DPTワクチン	任意				⑤			⑥※		
DTワクチン	定期							○※		対象年齢11~12歳。
子宮頸がん予防ワクチン	定期	「接種の積極的な勧奨」が一時中止されています。								対象は小学6年生~高校1年生。使用ワクチンによってスケジュール異なる。
髄膜炎ワクチン	任意									高校、大学などでの寮生活、海外留学の際には接種を。2歳から接種可能。
A型肝炎ワクチン	任意									流行地域への渡航の際には接種を。1歳から接種可能

※ 小学校入学後の百日せき患者が増えています。小学校入学前MR2回目と一緒に追加接種をすることをお勧めしています(任意接種)。

※ 11~12歳で二種混合(DT)ワクチンを接種しますが、2種混合ワクチンには百日せきワクチンが含まれていません。百日せき予防の効果を持続するために二種混合ワクチン(定期接種)を三種混合ワクチンに変更して接種する(任意接種)ことをお勧めしています。

※ ポリオに対する抗体価が低下する前に就学前に1回追加接種することを推奨(任意接種)。